

## Factsheet Zwangerschap en Geboorte

### Een globaal overzicht uit de Perinatale Registratie

In Nederland worden gegevens over de perinatale zorg door alle zorgverleners gezamenlijk vastgelegd in de Perinatale Registratie, een registratie die mede de basis vormt voor de Perinatale Audit. Deze factsheet presenteert gegevens, die voornamelijk uit de Perinatale Registratie afkomstig zijn. De focus ligt bij perinatale sterfte. Daarnaast wordt informatie gegeven over de gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de bevalling, over het aandeel (niet-)spontane bevallingen en over het zorgproces. Deze informatie is in meer detail terug te vinden in de publicatie "Perinatale Registratie Nederland, Grote Lijnen 1999-2012" van december 2013.

### Perinatale sterfte

Sterfte tijdens de zwangerschap, bevalling en in de eerste periode na de geboorte (perinatale sterfte) is een belangrijke indicator van de gezondheid van zwangere vrouwen en hun baby's en van de kwaliteit van de zorgverlening tijdens de zwangerschap en bevalling.

### Begrippen op een rij


- Foetale sterfte: doodgeboorte tijdens zwangerschap en bevalling. De hoogte van dit sterftecijfer is sterk afhankelijk van zwangerschapsduur waar vanaf wordt gerekend, bijvoorbeeld vanaf 22, 24 of 28 weken.
- Neonatale sterfte: sterfte van levendgeborenen die optreedt binnen 28 dagen na de geboorte. Deze is verder onder te verdelen in:
  - vroege neonatale sterfte: sterfte binnen 7 dagen na de bevalling (1<sup>e</sup> week)
  - late neonatale sterfte: sterfte tussen 7 en 28 dagen na de bevalling (2<sup>e</sup> - 4<sup>e</sup> week)
- Perinatale sterfte: combinatie van foetale en (vroege of totale) neonatale sterfte.

Bij vergelijking van perinatale sterfte is het dus belangrijk om te weten vanaf welke zwangerschapsduur en/of geboortegewicht wordt gerekend én welke periode na de bevalling in de cijfers wordt meegenomen.

### Nederlandse perinatale sterfte

In figuur 1 is de trend weergegeven van foetale, neonatale en perinatale sterfte voor de periode 1999-2012.

Figuur 1. Trend in foetale, neonatale en perinatale sterfte voor 1999-2012.



Bron: Perinatale Registratie Nederland, Grote Lijnen 1999-2012, december 2013.

Tabel 1 geeft de afnames in perinatale sterfte (> 22 weken of meer dan 500 gram, 28 dagen) over de laatste 12 jaar getalsmatig weer. Die sterfte is in 13 jaar tijd met 29% afgenomen van 11,9 per 1000 baby's in 2000 naar 8,5 per 1000 in 2012. De foetale sterfte (dodgeboorte) nam sterk af in de periode 2004-2010 (relatieve afname 18%), terwijl de neonatale sterfte vooral afnam in de periode 2000-2010 (relatieve afname 25%).

**Tabel 1. Afnames in perinatale sterfte in Nederland**

	Foetale sterfte	Neonatale sterfte	Perinatale sterfte	Relatieve afname t.o.v. 2000	Relatieve afname t.o.v. 2004	Relatieve afname t.o.v. 2010
2000	7,7	4,2	11,9	-	-	-
2004	7,0	3,5	10,5	9%	-	-
2010	5,7	3,3	9,0	26%	18%	-
2012	5,5	3,0	8,5	29%	21%	4%

Bron: Stichting Perinatale Registratie Nederland ([www.perinataleregistratie.nl](http://www.perinataleregistratie.nl))

*Noot bij tabel 1. De perinatale sterfte cijfers van 2000 kunnen afwijken van eerdere publicaties. Deze nieuwe getallen zijn tot stand gekomen door middel van een berekening die gelijk is aan de berekening van 2004, 2010 en 2012 om zo de vergelijkbaarheid over de jaren heen te optimaliseren.*

### Europese vergelijking

Uit nadere analyses van het grootschalige EURO-PERISTAT-onderzoek, waarvan de Europese bewerking in handen lag van TNO, blijkt dat foetale sterfte en neonatale sterfte op Europees niveau het meest betrouwbaar vergeleken kunnen worden vanaf respectievelijk 28 en 24 weken zwangerschapsduur. Dit omdat Europese landen verschillen in registratie en beleid bij kortere zwangerschapsduur.

Bij deze vergelijkingen nam de perinatale sterfte in Nederland met 28% af in zes jaar tijd (tabel 2). De foetale sterfte daalde van 4,3 per 1000 baby's in 2004 naar 2,9 per 1000 in 2010 (relatieve afname 33%) en de neonatale sterfte met 21% van 2,8 per 1000 naar 2,2 per 1000.

**Tabel 2. Europese vergelijking perinatale sterftecijfers Nederland**

		Foetale sterfte (28+ weken)	Neonatale sterfte (24+ weken – 28 dagen)	Perinatale sterfte
2004	NL	4,3	2,8	7,1
	Europees gemiddelde (spreiding)	3,4 (1,7-4,9)	2,8 (1,9-5,5)	6,2 (4,0-10,4)
2010	NL	2,9	2,2	5,1
	Europees gemiddelde (spreiding)	3,0 (1,5-4,3)	2,1 (1,1-3,3)	5,1 (3,1-7,5)
Relatieve afname NL (2010/2004)		33%	21%	28%
Relatieve afname EURO-PERISTAT (2010/2004)		12%	27%	18%


Bron: EURO-PERISTAT ([www.europeristat.com](http://www.europeristat.com)), data bewerkt door TNO

De Nederlandse positie in deze Europese rangorde verbeterde in zes jaar tijd van een ongunstige naar een gemiddelde positie voor de foetale en perinatale sterfte, maar veranderde niet voor de neonatale sterfte (reeds een gemiddelde positie in 2004), omdat andere Europese landen gemiddeld een sterkere afname van de neonatale sterfte kenden.

### Gemiddelde leeftijd bevallen vrouwen

In figuur 1 is de gemiddelde leeftijd gegeven waarop Nederlandse vrouwen bevielen voor de periode 1999-2012. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar vrouwen die voor de eerste keer bevielen (P0) en vrouwen die voor de tweede keer (of vaker) bevielen (P1+). In de periode 1999-2006 nam de gemiddelde leeftijd bij bevalling toe, terwijl deze in de periode 2007-2012 weer iets lijkt af te nemen.

**Figuur 2. Trend gemiddelde leeftijd bevallen vrouwen naar pariteit voor 1999-2012**



Bron: Perinatale Registratie Nederland, Grote Lijnen 1999-2012, december 2013.

### Zorg door verloskundigen en gynaecologen

In figuur 3 staat het gemiddelde verloop van het zorgproces bij Nederlandse zwangerschappen schematisch weergegeven, met voor iedere mogelijke stap (overdracht) de trend voor de jaren 1999-2012. Zowel het aantal overdrachten van eerste naar tweede lijn tijdens de zwangerschap als die tijdens de bevalling nemen toe. Het aantal bevallingen dat in de eerste lijn wordt gestart en voltooid is vanaf 1999 eerst gedaald, maar blijft de laatste jaren redelijk constant, op ongeveer 30%.

**Figuur 3. Trend in zorgproces voor 1999-2012**



Bron: Perinatale Registratie Nederland, Grote Lijnen 1999-2012, december 2013.

### Informatie in het Nationaal Kompas Volksgezondheid

Ook het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM geeft gedetailleerde informatie over sterfte rond de geboorte, over risicofactoren voor zwangere vrouwen, over etnische verschillen en over onderwerpen als congenitale afwijkingen of tienerzwangerschappen. Een goed ingang hiervoor is: <http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/sterfte-rond-de-geboorte/>.