

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

ActiZ, ZorgthuisNL, VGN, NVZ, NFU
cc FNV, CNV, NU'91, FBZ, V&VN, NVAVG, Verenso, ZN

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Kenmerk
3303244-1022593-CZ

Uw brief

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Datum 24 december 2021
Betreft Gebruik FFP2-maskers in de zorg

Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode hebben wij regelmatig overleg gevoerd over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Alle mensen die werken in de zorg moeten er immers op kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen met voldoende en adequate beschermingsmiddelen. Dit is ook in belang van de kwetsbare mensen voor wie ze zorg verlenen en de continuïteit van zorg.

Met de opkomende Omikron-variant is de discussie over het gebruik van FFP2-maskers opnieuw actueel geworden. Over de aard en de verspreiding van dit virus is nog onvoldoende bekend, al groeit dat inzicht gestaag. Tegen deze achtergrond is van diverse kanten gevraagd naar het (preventief) gebruik van FFP2-maskers, zoals tijdens het debat over het coronavirus van 21 december jl. in de Tweede Kamer. Daarbij wordt ook verwezen naar WHO-aanbevelingen. Ik heb hierover het OMT om advies gevraagd. Hierbij informeer ik u over dit advies en over mijn besluit een deel van de LCH-voorraad van FFP2-maskers beschikbaar te stellen.

Als zorgverleners, gegeven hun professionele inschatting en/of behoefte aan veilig werken, FFP2-maskers willen gebruiken is hiervoor ruimte in de door experts opgestelde richtlijnen en uitgangspunten en is het belangrijk dat zorgverleners in voldoende mate over FFP2-maskers kunnen beschikken.

Inzichten OMT en FMS

Ik hecht eraan te benadrukken dat het niet aan het kabinet is om te beslissen over welke persoonlijke beschermingsmiddelen in welke situatie te gebruiken.

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medische Specialisten (FMS) heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van PBM die zich primair richten op de ziekenhuissetting (de leidraad 'Persoonlijke bescherming in de (poli)-klinische setting vanwege SARS-CoV-2'). Dit team heeft recent de vraag besproken of in de leidraad niet in meer situaties een FFP2-masker geadviseerd moet worden in plaats van een chirurgisch masker (IIR). Het expertiseteam stelt in reactie dat op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke data te zien die aanpassing van de leidraad rechtvaardigen. Daarmee blijven de huidige aanbevelingen rondom maskergebruik onveranderd van kracht. Het Expertiseteam houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten om aanpassingen waar nodig snel te kunnen

doorvoeren in de praktijk. Het gaat hier om een minimumadvies, het staat een ruimer gebruik van FFP2-maskers, op basis van een lokale risicoanalyse, niet in de weg. In de praktijk vindt vaak ook een ruimer gebruik plaats.

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg
Afdeling 3

Het RIVM-document 'Uitgangspunten voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis' is op verzoek van de sector en op basis van OMT-adviezen door het RIVM opgesteld. Dat heeft het RIVM gedaan op basis van zijn medische expertise en ervaring op het terrein van infectiebestrijding en vanuit zijn onafhankelijke positie. Veel (para)medische beroepsorganisaties hebben inmiddels handreikingen voor infectiepreventie en het gebruik van PBM bij COVID-19 voor hun eigen beroepsgroep of sector opgesteld. De bonden hebben dat ook gedaan.

Kern van de uitgangspunten is dat het gebruik van PBM een aanvulling vormt op algemene preventieve maatregelen en het gebruik van het type masker afhangt van de specifieke situatie en handeling. Zo worden bij aerosolvormende handelingen FFP2-maskers gebruikt. Ook bij situaties waarbij de inschatting is dat er mogelijk een verhoogd risico is op het vrijkomen van zeer kleine druppeltjes, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een COVID-19-positieve/-verdachte patiënt/cliënt, is een FFP2-mondneusmasker te overwegen.

In de uitgangspunten is ook opgenomen dat als de specifieke situatie daarom vraagt, zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd kunnen afwijken van de uitgangspunten. Een ruimer gebruik van FFP2-maskers kan passend zijn en vindt in de praktijk ook plaats. Tegelijkertijd leven er vragen over het ruimer (preventief) gebruik van FFP2-masker in het licht van de opkomst van de Omikron-variant.

Het OMT realiseert zich dat er ongerustheid is. In zijn 135^e advies (24 december 2021) adviseert het OMT na raadpleging van de beschikbare wetenschappelijke evidence en internationale richtlijnen, inbegrepen die vanuit de WHO expertgroep, op dit moment geen aanpassing van de vigerende richtlijnen voor mondneusmaskerbeleid in de gezondheidszorg. Met uitzondering van aerosolvormende procedures is er vooralsnog geen bewijs dat het gebruik van FFP2-maskers tot minder infecties leidt dan het gebruik van chirurgische mondneusmaskers IIR. Bij contact met COVID-patiënten wordt daarom het gebruik van een chirurgisch masker IIR of een FFP2-masker, in combinatie met de aanvullende PBM en maatregelen geadviseerd. FFP2-maskers dienen altijd te worden gebruikt bij COVID-patiënten waarbij aerosolvormende handelingen worden toegepast. Op COVID-cohort afdelingen waar veel aerosolvormende handelingen worden toegepast kan overwogen worden uitsluitend FFP2-maskers te gebruiken. In situaties met intensieve blootstelling aan COVID-patiënten kan uit voorzorg aanbevolen worden om een FFP2-masker te gebruiken. Mocht men ervoor kiezen een FFP2-masker te gebruiken, dan is scholing in de juiste toepassing van de maskers overigens essentieel: controle op het nauw aansluiten van het masker en de afwezigheid van lekluft.

Op basis van het OMT-advies zijn de uitgangspunten voor PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis per 24 december 2021 nader verduidelijkt op de site van het RIVM (<https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMBuitenziekenhuis>).

Gebruik FFP2-maskers

Als zorgverleners, gegeven hun professionele inschatting en/of behoefte aan veilig werken, FFP2-maskers willen gebruiken is hiervoor dus ruimte in de door experts

opgestelde richtlijnen en uitgangspunten en is het belangrijk dat zorgverleners in voldoende mate over FFP2-maskers kunnen beschikken. Er dient gelegenheid te zijn voor het gesprek hierover tussen zorgprofessionals en hun werkgevers. Bij een (ervaren) gebrek aan ruimte voor een professionele afweging dan wel een (ervaren) tekort aan beschermingsmiddelen is het belangrijk dat medewerkers dit met hun werkgever bespreken. Biedt dit gesprek geen uitkomst, dan kunnen professionals dit melden bij de Inspectie SZW en/of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gegeven de opkomst van de Omikron-variant en de daarmee gepaard gaande onzekerheid roep ik u daarom op dit gesprek aan te gaan, ruimte te bieden voor meer gebruik van FFP2-maskers en voldoende FFP2-maskers beschikbaar te stellen.

Bestelmogelijkheid LCH

Ik wil erop wijzen dat FFP2-maskers in ruime mate beschikbaar zijn en ook op veel plaatsen worden gebruikt. Om het gebruik van deze maskers een extra boost te geven om zo de drempel om FFP2-maskers te gebruiken en beschikbaar te stellen aan zorgverleners verder te verlagen zal begin januari 2022 eenmalig de mogelijkheid worden geboden om via het LCH FFP2-maskers tegen sterk gereduceerd tarief te bestellen. Deze maskers zijn uiteraard alleen bestemd voor eigen gebruik binnen de instelling. Via de gebruikelijke LCH-procedures kunnen zorgaanbieders van 4 t/m 18 januari 2022, of zolang de voorraad strekt, een bestelling doen. Dit kan via www.lchulpmiddelen.nl. Bij de verdeling zal een verdeelsleutel worden gehanteerd.

Ik vertrouw erop dat wij met elkaar een zo veilig mogelijke werksituatie voor zorgverleners kunnen borgen en veilig zorg kunnen blijven verlenen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge