

Bijlage D: Beoordelingstabel

De drie categorieën dieren uit de Transportverordening (Gezond, Dieren met afwijkingen en Niet transportwaardige dieren) versus de hoofdcategorieën transport(duur) te weten: A) Binnenlands vervoer zonder VC; B) Binnenlands vervoer met VC; en C) Grensoverschrijdend transport via VC; en NTW (Niet Transportwaardig)

Gezonde dieren				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren	Belangrijkste risico verhogende factoren	Mogelijke risico reducerende maatregelen ¹	Inschatting/ beoordeling Transportwaardigheid
Gezond dier	<u>Algemene en specifieke gezondheidskenmerken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alert dier dat reageert op omgeving • glanzende en droge huid, goed verzorgd, • normale ademhaling, • goede lichamelijke conditie, • gewicht wordt gelijkmatig over alle vier de poten verdeeld tijdens staan of lopen, rechte rug, • geen zichtbare tekenen van pijn, • niet lacterend BSC: ≥ 2,5 LCS ² : 0-1 Rectale temperatuur: 37,5-39,0 °C	Transportduur	Beperking maximale transport duur ³	A B C

¹ Voor alle gevallen gelden de wettelijke voorzorgen zoals hitte protocol; wettelijke eisen veewagen; wettelijke eisen voeren & drenken en rusttijden. Bij twijfel kan voorschrijven van extra voorzorgsmaatregelen ('zorgtransport') zoals individueel transport; afgescheiden met tussenschot; en extra stro het dierenwelzijnsrisico beperken (geen volledige opsomming).

² DairyCo Mobility Score scoort van 0 (normaal) – tot 3 (ernstig kreupel; <https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project>; https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf zoals toegepast in het EU Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1)

³ De FAWC adviseert op basis van recente systematische review de Engelse overheid om de transportduur van runderen te maximaliseren tot 21 uur.

Dieren met afwijkingen				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren voor risicoprofiel ⁴	Belangrijkste risico verhogende factoren	Risico reducerende maatregelen ⁵	Mogelijke beoordelingen Transportwaardigheid
Lacterend dier	<u>Kenmerken koe in lactatie:</u> Vol uier Melk lekken	Niet tijdig en/of onvoldoende uitmelken Gelijktijdige andere afwijkingen	Zo vaak als nodig melken, minimaal iedere 12 uur Geen vervoer via VCs	A (B, C) ⁶
Vermagerd dier	<u>Body Condition Score:</u> BCS: >1-< 2-2,5	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen (zoals kreupelheid)	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A (B, C) NTW ⁷
	<u>Body Condition Score:</u> BCS: ≤ 1 (cachexie)	Idem	Geen transport	NTW
Locomotie problemen	<u>Locomotie kenmerken:</u> Ongelijkmatige tred/kreupel: Dier belast alle 4 poten maar mogelijk niet evenredig <i>en/of</i> LCS ⁸ : 1-2 <i>en/of</i> Sporen van/aanwezigheid van koekluister: ja/nee	Idem	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A NTW

⁴ In alle gevallen dienen algemene gezondheidskenmerken van de dieren te worden beoordeeld: attent en reagerend op omgeving, schone en droge huid, goed verzorgd, normale ademhaling, goede lichaamsconditie, verdeelt gewicht evenredig over 4 poten bij staan en lopen, rechte rug en geen uitingen van pijn? (Consortium van het Animal Transport Guides Project; 2017-rev1)

⁵ Voor alle gevallen gelden de wettelijke voorzorgen zoals hitte protocol; wettelijke eisen veewagen; wettelijke eisen voeren & drinken en rusttijden. Bij twijfel kan voorschrijven van extra voorzorgsmaatregelen ('zorgtransport') zoals individueel transport; afgescheiden met tussenschot; en extra stro het dierenwelzijnsrisico beperken (geen volledige opsomming).

⁶ B, C zonder bijkomende afwijkingen of risicoverhogende factoren

⁷ NTW met bijkomende afwijkingen of risicoverhogende factoren

⁸ Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1); DairyCo Mobility Score <https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project>; https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf

Dieren met afwijkingen				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren voor risicoprofiel ⁴	Belangrijkste risico verhogende factoren	Risico reducerende maatregelen ⁵	Mogelijke beoordelingen Transportwaardigheid
	<u>Locomotie kenmerken:</u> Ongelijkmatige tred/kreupel: Dier wil 1 of poot niet belasten <i>en/of</i> LCS ⁹ : 2-3 <i>en</i> sporen van/aanwezigheid van koekluister	Idem	Geen transport	NTW
Lichaamstemperatuur (verdenking afwijkende temperatuur)	<u>Lichaamstemperatuur:</u> Licht verhoogde lichaamstemperatuur: ≥ 39,0°C - ≤ 39,5°C	Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, beladingsdichtheid en ventilatie tijdens transport, niet kunnen drinken Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A (B, C) NTW
	<u>Lichaamstemperatuur:</u> Koorts: > 39,5°C <i>en/of</i> tekenen van algemeen ziek zijn Hypothermie: < 37,5°C en in elkaar gedoken, dicht op elkaar staan, rillen en opstaande haren	Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, beladingsdichtheid en ventilatie tijdens transport, niet kunnen drinken Gelijktijdige andere afwijkingen	Zorgtransport	A ¹⁰ NTW
Uierproblemen	<u>Aard en omvang uierprobleem:</u> Gelocaliseerde, niet perforerende wond of ontsteking zonder uitvloeiing <i>en</i> geen koorts <i>en</i> niet algemeen ziek zijn	Transportduur Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur	A (B, C) NTW
	<u>Aard en omvang uierprobleem:</u> Uitgebreide, <i>en/of</i> perforerende wond of ontsteking <i>en/of</i> met uitvloeiing <i>en/of</i> dier met uierwond en met koorts > 39,5°C <i>en/of</i> tekenen van algemeen ziek zijn	Idem	Geen transport	NTW

⁹ Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1); DairyCo Mobility Score <https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project>;
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf

¹⁰ Dieren met koorts zijn niet slachtwaardig en mogen niet naar een slachthuis worden vervoerd

Dieren met afwijkingen				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren voor risicoprofiel ⁴	Belangrijkste risico verhogende factoren	Risico reducerende maatregelen ⁵	Mogelijke beoordelingen Transportwaardigheid
	<u>Aard en omvang uierprobleem:</u> koorts > 39,5°C en/of tekenen van algemeen ziek zijn, en/of vlokken in de melk, en/of een warm, gezwollen, en/of pijnlijk uier.	Idem	Geen transport	NTW
	<u>Aard en omvang uierprobleem:</u> koorts > 39,5°C en/of tekenen van algemeen ziek zijn en/of gangreneuze mastitis; paarse of blauwe uier, met vochtige, glinsterende wond en/of hoog risico op sterfte	Idem	Geen transport	NTW
Pijnuitingen	<u>Tekenen van pijn:</u> Lage kophouding, bolle rug, achterpoten ver onder haar lichaam, schuimbekken, knarsetanden	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A NTW
Operatie wonden	<u>Omvang en versheid wond, mate van wondvocht/ bloedverlies, toestand hechtingen:</u> Beperkte (nagenoeg) geheelde wonden met geen of zeer beperkt bloedverlies en sluitende hechtingen, al dan niet (deels) geresorbeerd	Transportduur	Beperking transport duur	A B C
	<u>Omvang en versheid wond, mate van wondvocht/ bloedverlies, toestand hechtingen:</u> Omvangrijke, en/of niet geheelde wonden en/of met bloedverlies en/of slecht sluitende hechtingen	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A NTW
Huidverwondingen of ontstekingen	<u>Omvang en versheid wond, mate van wondvocht/bloedverlies:</u> Beperkte (nagenoeg) geheelde huidwonden of huidontstekingen met geen of zeer beperkt bloedverlies	Transportduur	Beperking transport duur	A B C

Dieren met afwijkingen				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren voor risicoprofiel ⁴	Belangrijkste risico verhogende factoren	Risico reducerende maatregelen ⁵	Mogelijke beoordelingen Transportwaardigheid
	<u>Omvang en versheid wond, mate van wondvocht/bloedverlies:</u> Omvangrijke, en/of niet geheelde huidwonden of huidontstekingen en/of met bloedverlies	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A NTW
Uitvloeiing	<u>Aard (bloed, pus, exsudaat) hoeveelheid, kleur, consistentie en geur van uitvloeiing:</u> Dieren met uitvloeiing (bloed, pus, exsudaat) uit bv bek, neus, vulva, penis	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A (B, C) NTW
Zwellingen	<u>Omvang, aard, locatie zwelling en gevolgen voor algemene toestand dier:</u> Lokaal en beperkte zwelling; niet warme, rood of pijnlijk zwelling; veroorzaakt geen afwijkende tred; heeft geen verhoogd risico voor oplopen van verwondingen tijdens transport	Transportduur	Beperking transport duur	A B C
	<u>Omvang, aard, locatie zwelling en gevolgen voor algemene toestand dier:</u> Uitgebreide zwelling en/of warme, rode of pijnlijke zwelling; en/of veroorzaakt afwijkende tred en/of heeft verhoogd risico voor oplopen van verwondingen tijdens transport	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Beperken herhaald in-en uitladen Geen vervoer via VCs Zorgtransport	A NTW
Tympanie	<u>Omvang, locatie gasophoping en gevolgen voor algemene toestand dier:</u> Mate van gasophoping; éénzijdige of beiderzijdse zwelling; mate verhoogde ademhaling, risico van circulatieproblemen en plotselinge dood	Transportduur Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Zorgtransport	A (B, C) NTW

Dieren met afwijkingen				
Waarneming	Kenmerkende beoordelingsindicatoren voor risicoprofiel ⁴	Belangrijkste risico verhogende factoren	Risico reducerende maatregelen ⁵	Mogelijke beoordelingen Transportwaardigheid
Diarree	<u>Aspect en mate ontlasting</u> <u>Mate van vochtverlies: huid turgor en gevolgen voor algemene toestand dier:</u> Matige tot ernstige, dunne tot waterdunne diarree, goede of slechte turgor, lichamelijke conditie	Transportduur Niet kunnen drinken Gelijktijdige andere afwijkingen zoals slechte conditie	Beperking transport duur Zorgtransport	A (B, C) NTW
Ademhaling	<u>Ademfrequentie en type:</u> Licht verhoogde ademfrequentie en/of lichte buikademhaling; verwachte omgevingsfactoren (hitte) en management factoren (voorgenomen transport) niet risicoverhogend	Transportduur Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, beladingsdichtheid en ventilatie tijdens transport Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Zorgtransport	A (B, C) NTW
	<u>Ademfrequentie en type:</u> dier in ademnood; met sterk verhoogde ademfrequentie en/of buikademhaling dat met open bek en/of met gestrekte kop en nek ademt, en/of met voorpoten wijd uiteen, en/of lucht staat te happen en mogelijk ook slechte conditie heeft	Idem	Geen transport	NTW
Afwijkend gedrag	<u>Gedragskenmerken, algemene gezondheidstoestand:</u> Apatisch, of agressief; of nerveuze verschijnselen; of niet willen of afwijkend eten/drinken; of gedrag gevaarlijk voor dier zelf, en/of voor andere dieren of mensen, en/of aanwezigheid ander onderliggend lijden	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen	Beperking transport duur Zorgtransport	A (B, C) NTW
Oogproblemen	<u>Blindheid of slechtziendheid:</u> Blindheid of slechtziend aan 1 of beide ogen, waterige, doffe ogen en/of aanwezigheid ander onderliggend lijden	Transportduur Herhaald inladen-uitladen Verblijf op VC Gelijktijdige andere afwijkingen Afgezonderd worden van eigen sociale groep	Beperking transport duur Zorgtransport	A (B, C) NTW

Dieren met ernstige afwijkingen – Niet Transportwaardig conform Transportverordening		
Risicofactor dier	Waarneming	Kenmerkende beoordelings indicatoren ¹¹
Stadium dracht	Tekenen van naderende of juist recente geboorte	In laatste maand dracht of binnen week geleden gekalfd
Bewegingsgemak	Blijven liggen	Niet in staat zich op eigen kracht pijnloos te bewegen Niet kunnen staan of zonder hulp te lopen
Wonden	Open wonden	Ernstige open wonden
Prolaps	Uitstulpend weefsel	Prolaps van rectum, uterus of vagina; koe die aan nageboorte staat

*Niet transportwaardig
Bronnen: zie tekst

¹¹ In alle gevallen dienen algemene gezondheidskenmerken van de dieren te worden beoordeeld: attent en reagerend op omgeving, schone en droge huid, goed verzorgd, normale ademhaling, goede lichaamsconditie, verdeelt gewicht evenredig over 4 poten bij staan en lopen, rechte rug en geen uitingen van pijn? (EU, 2018; Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1)